Maurice NECHELPUT

# COMMENT PEUT-ON DEVENIR CHAMPION ?

**CINQUANTE** ANNÉES D'EXPÉRIENCE
MISE A LA DISPOSITION DES COLOMBOPHILES
PAR UNE
**" MÉTHODE ULTRA-MODERNE "**



1956

Editions « La Colombe »
Uccle-Bruxelles

## ¿COMO PUEDE UNO CONVERTIRSE EN CAMPEÓN?

50 años de experiencia a disposición de los colombófilos por un método ultra moderno

Autor – Maurice Nechelput – Bruselas – 1956

Traducción del francés – Néstor Diego

### PREFACIO

En 1952, por orden de mi médico, me vi obligado a vender todo mi palomar.

Pero la temporada siguiente, a instancias de algunos aficionados, visité sus palomares y les di el asesoramiento que me pidieron.

Mientras mi salud me lo permitió, pude seguir de cerca el mundo de las carreras de palomas sin la carga de mantener un palomar.

Era una gran satisfacción para mí cada vez que sabía que mis consejos habían dado fruto.

Durante mis periodos de descanso forzoso, recopilé para su beneficio los resultados de cincuenta años de experiencia y desarrollé un método integral y constructivo, cuyos resultados fueron verdaderamente concluyentes, ya que permitieron, en particular, que un joven aficionado, recién iniciado en las carreras de palomas, ascendiera en dos años a la élite de un grupo de importantes sociedades locales, donde se inscriben aproximadamente dos mil palomas cada domingo.

Algunos amigos colombófilos me animaron a plasmar estas notas por escrito.

Son, repito, el fruto de cincuenta años de investigación y reflexión sobre las carreras de palomas.

Estoy convencido de que he facilitado a quienes deseen leerlas un rápido progreso y la ascensión en el mundo de las carreras de palomas sin tropiezos, que es el objetivo final de todo aficionado.

Este método ultra moderno permitirá a los colombófilos experimentados mantenerse al día y no quedarse atrás, a los aficionados de nivel medio alcanzar la cima y a los jóvenes y principiantes competir con los veteranos.

Para ello, solo tendrán que seguir el ejemplo de un joven colombófilo mencionado en el folleto.

Podrán guiar a sus palomas hacia el éxito, tal como él lo hizo con su nueva colonia, tanto en la cría como en las carreras.

### LA PALOMA EN GENERAL

Comprar palomas con grandes sumas de dinero y lograr, durante uno o dos años, obtener buenos precios, no puede considerarse una hazaña digna de un verdadero colombófilo.

¿Cuántos nombres nuevos hemos visto brillar en el firmamento para luego desaparecer como estrellas fugaces?

Esto suele deberse a la falta de conocimiento e interés que los colombófilos tienen en las propias palomas.

Es fundamental saber determinar sus cualidades y defectos, observarlas atentamente, cuidarlas, apreciarlas, compararlas y seleccionarlas.

En resumen, aprendamos a ser nosotros mismos los selectores.

Explicaré con precisión cómo se pueden identificar las cualidades y los defectos de las palomas mensajeras.

Una buena paloma debe poseer una calidad integral. Y quiero dejar claro desde el principio que una buena paloma no será aquella que gane un premio a la excelencia en un área en particular, sino aquella que posea todas las cualidades, sin dar una importancia desproporcionada a ninguna de ellas.

Para ello, desarrollaremos sucesivamente los siguientes aspectos: conformación, respiración, equilibrio, estructura ósea, musculatura y alas.

En resumen, todo lo que se pueda observar, sentir y comparar para la selección.

Sin olvidar su sentido de la orientación.

Nacen con un sentido de la orientación que les permite regresar al palomar independientemente de la dirección en la que sean liberados.

Solo la cesta puede determinar mejor el grado de desarrollo de este sentido.

El entrenamiento con buen tiempo, cuando la paloma está sana, y mejor aún, en buenas condiciones, le permitirá aprovechar al máximo su sentido de la orientación, y aumentará y fortalecerá su confianza.

En definitiva, una buena paloma debe tenerlo todo.

## CONFORMACIÓN

Examinemos la conformación anatómica de la paloma mensajera.

Las palomas se pueden clasificar en diferentes tipos y, hasta cierto punto, podemos determinar sus aptitudes probables.

Dentro de cada una de estas categorías, existen buenas palomas.

Las palomas con proporciones corporales reducidas, una constitución robusta y una musculatura fuerte y corta, tienen aptitud para la velocidad.

Las buenas palomas de media distancia tienen mejor estructura ósea y musculatura; sus músculos son más largos y están bien desarrollados; poseen articulaciones fuertes y flexibles; y sus músculos de los hombros y pectorales deben estar bien desarrollados.

Son de tamaño mediano.

Las mejores palomas de larga distancia son generalmente más pequeñas y ligeras, de constitución media y de tamaño mediano, con tendencia a tener el cuerpo alargado.

Tienen músculos alargados y poseen flexibilidad general.

Independientemente del tipo, una buena paloma debe tener un esqueleto rígido, fuerte y ligero.

Debe ser de una sola pieza, sin interrupción en los cuartos traseros, y poseer una grupa ancha y sólida.

## EL ESQUELETO

La estructura ósea debe ser muy proporcionada, rígida y fuerte, con huesos anchos, flexibles y bien fusionados.

El esternón debe ser ancho, bien desarrollado hacia adelante, con una rana ligeramente curvada, fuerte y flexible.

La horquilla delantera debe evitar que las alas se junten durante el vuelo.

Consta de dos ramas unidas ubicadas en la parte frontal del esternón.

Deben ser muy elásticas, curvas, bien espaciadas y fuertes.

Una horquilla en forma de V es indeseable, ya que carece de resistencia.

La forma de la horquilla se puede comprobar desde el momento en que el ave joven comienza a volar.

En cuanto a la resistencia, debe tenerse en cuenta que la osificación aún está en desarrollo y es imperfecta en las palomas jóvenes.

La articulación del hombro debe ser muy flexible para permitir una amplia gama de movimientos de las alas.

También en esta región se encuentran los músculos del hombro, que se insertan en las partes superiores de las ramas de la horquilla, y que se analizarán con más detalle en el capítulo sobre musculatura.

La quilla, gruesa y ligeramente convexa, debe extenderse hacia adelante y formar una línea continua con una bifurcación posterior uniforme, cuyos dos huesos deben ser fuertes en una paloma bien desarrollada.

Las palomas con una estructura ósea tan rígida, sólida, ligera y equilibrada son aves de gran resistencia.

Sin una buena estructura ósea, no se puede tener una buena musculatura.

La estructura ósea no debe ser ni excesiva ni insuficiente.

Debe estar bien fusionada, ser fuerte y ligera.

## MUSCULATURA

Todos los movimientos de las palomas se producen mediante la contracción muscular.

El desarrollo y la calidad de estos músculos son de suma importancia.

Al palparlos, se pueden distinguir los músculos de fuerza, flexibilidad y resistencia, según si están bien desarrollados, prominentes, cortos o largos, delgados, planos, duros, flexibles o elásticos.

Un aumento del tono muscular es un signo innegable de mejor salud.

Una disminución es lo contrario.

También puede indicar una enfermedad en desarrollo.

A veces, el tono muscular disminuye durante una alteración temporal.

En varios casos, observando atentamente a la paloma, se puede notar una ligera disminución del tono muscular durante la muda de una pluma primaria.

Este vuelve a la normalidad después de unos días.

La elasticidad y el volumen de los músculos disminuyen después de una enfermedad, debido a la edad, el frío extremo, etc.

Cuando estos músculos se debilitan, la paloma puede estar enferma, sobrecargada, agotada o debilitada.

El desarrollo muscular es el indicador que permite al colombófilo observador determinar si un ave está mejorando, alcanzando su máximo rendimiento, decayendo, fatigada, etc.

Para ello, es necesario que el colombófilo observe atentamente a sus palomas.

Tras un periodo de ejercicio y práctica para evaluar la musculatura, el propietario podrá determinar de inmediato el valor y la condición de sus palomas, una vez que haya adquirido experiencia, basándose en dicha musculatura.

Como se indica en la sección "Esqueleto", la correcta conformación de la rana es de suma importancia.

Los músculos del hombro se insertan en la parte superior de las patas de la rana.

Estos músculos deben cubrir ambos extremos superiores de las patas, estar bien desarrollados, ser redondeados y muy flexibles.

Si al palpar los huesos en estos extremos no encuentra suficiente musculatura, descarte la paloma.

¿Cómo detectar y definir esta musculatura crucial?

Sostenga la paloma suavemente con la mano derecha, a 10 cm del cuerpo (para poder pasar la mano por debajo, con la palma hacia abajo), en posición horizontal, con las puntas de las plumas de vuelo ligeramente cruzadas.

Cuando esté bien equilibrada y tranquila, deslice suavemente el pulgar de la mano izquierda sobre la parte superior derecha de la horquilla y el dedo medio sobre la parte superior izquierda.

El movimiento debe comenzar en las puntas de los huesos superiores de la horquilla y extenderse hacia atrás, manteniendo la palma de la mano por debajo.

Si eres zurdo, sujeta la paloma con la mano izquierda y palpala con la derecha.

Acariciarla suavemente y de forma continua; sentirás el músculo o la punta del hueso.

Descarta sin dudarlo cualquier paloma donde sientas el hueso y la musculatura sea insuficiente.

Practica definiendo su volumen, observando si son prominentes (redondos, redondos, largos, delgados, duros o blandos).

El músculo duro debe eliminarse.

Para comprobar los músculos pectorales, aplica una presión muy ligera con el pulgar a un lado del esternón y con el dedo medio al otro.

En preparación para las carreras, si observas que la quilla de la paloma está recogida (que los músculos sobresalen), la paloma está en buena forma y rara vez sufrirá un percance durante un viaje en condiciones climáticas normales.

La paloma aún se encuentra en buen estado cuando el examen requiere una ligera presión que provoca la retracción del esternón.

Esta paloma puede presentar una debilidad temporal, causada por la muda de una pluma primaria o algún otro trastorno.

El esternón sobresaldrá temporalmente.

Si, tras unos días, el tono muscular aumenta, se puede volver a examinar con buenas probabilidades de éxito.

Una paloma con músculos pectorales suficientes, pero cuyo esternón sobresale visiblemente, no debe ser examinada en estas condiciones.

El volumen de los músculos del hombro también habrá disminuido.

Esta paloma suele estar demasiado ligera.

Observe si picotea demasiado sus semillas preferidas, lo que puede causar esta mala condición.

En cuanto los músculos recuperen su firmeza, tendrá buenas probabilidades de colocarse correctamente.

Los músculos están interconectados y se influyen mutuamente.

Por ejemplo, los músculos del hombro y del ala realizan un trabajo directo y enorme durante el vuelo.

La fatiga que sienten los músculos de las extremidades se transmite a los demás, en distintos grados.

La sangre fluye por todos los músculos y transporta los productos de desecho (generados por el esfuerzo) a todos los órganos, lo que provoca fatiga general.

El nivel de condición física, su límite máximo, la mala condición física y el sobre esfuerzo pueden definirse con precisión cuando existen dispositivos para medir el ritmo cardíaco de una paloma.

El procedimiento debe ser el siguiente:

1. Registrar el número de latidos cardíacos en reposo;

2. Registrar el mismo número al ser enjaulada;

3. Registrarlo al regresar del vuelo, después del esfuerzo;

4. Observar el tiempo que tarda el ritmo cardíaco en normalizarse.

El tiempo mínimo necesario para que la paloma vuelva a la normalidad debe anotarse y utilizarse como referencia.

Lamentablemente, si existe un dispositivo así, sin duda no está al alcance del aficionado promedio a las palomas mensajeras.

Así que confiemos en nuestra experiencia y observaciones.

Una de las grandes cualidades de un buen aficionado es, sin duda, tener una gran capacidad de observación. Esforcémonos especialmente por cultivar y desarrollar esta cualidad en nuestro propio palomar.

Estudiemos y comparemos la musculatura con mucha atención.

Sigamos su evolución sucesivamente a lo largo de todas las etapas de la vida de la paloma.

La experiencia adquirida será invaluable para el correcto manejo de nuestra colonia.

Para respaldar mis afirmaciones, me gustaría contarles una anécdota.

Un colombófilo muy experimentado, conocido por sus excelentes resultados en carreras de media y larga distancia, me comentó un día que había examinado la musculatura de sus palomas antes de enjaularlas y a su regreso de la carrera.

Su paloma ganadora del primer premio en Dax tenía los músculos pectorales y de los hombros más flexibles, había regresado en las mejores condiciones posibles y, de haberlo previsto, habría apostado más por ella.

Una prueba más de la importancia de la musculatura.

Una paloma con buenos músculos en los hombros tiene buenos músculos pectorales.

Uno influye en el otro y depende de él.

## RESPIRACIÓN

La paloma, al carecer de glándulas sudoríparas, debe regular su temperatura mediante la respiración.

Su frecuencia respiratoria es muy alta, lo que resulta en una elevada demanda de oxígeno.

Por lo tanto, es esencial que viva en un palomar bien ventilado.

Sin un suministro continuo de aire, su supervivencia es imposible.

El palomar debe estar bien iluminado, ser luminoso, seco y estar bien ventilado.

Deben evitarse los palomares cerrados con vidrio, similares a invernaderos.

En ellos se producen fluctuaciones de temperatura excesivas y repentinas.

Debe evitarse cualquier corriente de aire en el palomar.

El aire puede introducirse mediante filtración (posiblemente cubriendo el espacio con dos o más mosquiteras superpuestas).

En una paloma sana, los movimientos respiratorios son tranquilos y regulares.

Estos movimientos reflejos pueden acelerarse bajo la influencia del miedo, el nerviosismo, etc.

Por lo tanto, observemos a la paloma cuando esté tranquila.

La respiración rápida y artificial es perceptible en las palomas con trastornos cardio respiratorios.

Eliminémoslas.

La respiración influye enormemente en la circulación.

Por lo tanto, es necesario asegurarse de que no haya hinchazón, ni molestias respiratorias, y que los órganos estén libres de defectos.

La boca debe estar ligeramente abierta, libre y con los bordes finamente aserrados.

La abertura de la laringe debe ser pequeña, ovalada y con los bordes finamente aserrados.

El paladar blando también debe tener bordes regulares y finamente aserrados.

Si la lengua reposa profundamente y se puede introducir un dedo en la parte posterior del pico, la paloma presenta una deficiencia interna.

Suprimirla.

Los órganos visibles del pico no deben estar deformados y deben tener un color rosa intenso.

Si observa mucosidad en la parte posterior del pico, presione suavemente el esófago y la paloma emitirá un sonido similar a un chasquido.

Esto indica dificultad respiratoria. Un entorno inadecuado, la alimentación o incluso la propia naturaleza de la paloma (que no asimila bien las semillas), la sobre alimentación, etc., pueden ser la causa.

Durante dos días, dele a la paloma una pizca de bicarbonato de sodio en el pico cada mañana, y al tercer día, dos granos de sal de Carlsbad junto con un poco de cebada.

Este remedio también puede usarse para las manchas blancas.

En el caso de las manchas blancas, determine si son crónicas o temporales.

Suelen ser consecuencia del calentamiento de alimentos como el cáñamo, la colza, el nabo forrajero o un exceso de veza.

Podría tratarse de difteria.

Las palomas fuertes superan esta enfermedad, pero causa mucho daño a las más débiles.

La ciencia moderna cree haber superado esta enfermedad mediante la vacunación anual.

En cualquier caso, no me atrevo a recomendarla y dejo que cada criador juzgue por sí mismo.

Las gargantas de color azul rojizo también suelen ser consecuencia del calentamiento excesivo de los alimentos y del consumo excesivo de semillas oleaginosas, que además son extremadamente perjudiciales para el hígado.

Las palomas con la punta de la lengua azulada se clasifican como de mala circulación sanguínea.

Siempre las he excluido de la raza y siempre me he abstenido de criarlas.

Las palomas cuya lengua se encuentra demasiado profunda en la garganta, aquellas con gargantas profundas y anchas, o cuyos órganos están pálidos (anemia), no merecen la pena conservarse.

Generalmente son débiles y sufren deficiencias internas.

Sin una respiración adecuada, no puede haber una circulación adecuada.

Una influye en la otra.

VITALIDAD

El ojo de una paloma con alta vitalidad es nítido y vivaz.

La pupila, redonda, de tamaño pequeño a mediano, debe ser de un negro brillante.

Los anillos que la rodean deben ser finos y regulares.

La mirada debe ser inteligente.

Cuando la paloma está en buenas condiciones, la pupila se dilata y sus saltos también son signos de vitalidad.

Los músculos deben ser firmes y flexibles.

El plumaje debe ser sedoso como el plumón.

La vitalidad suele disminuir en las palomas criadas por endogamia.

Lo mismo ocurre con aquellas que carecen de oxígeno o que se alojan en palomares mal ventilados y superpoblados.

La edad, el frío y la humedad también afectan la vitalidad.

El volumen y la elasticidad muscular disminuyen.

Las palomas cuyas reservas de sangre y tejido se agotan debido al sobre esfuerzo muestran signos profundos de fatiga y su vitalidad disminuye.

Las palomas con alta vitalidad se recuperan rápidamente después del esfuerzo.

Se pueden distinguir entre sí mediante la comparación poco después de su regreso de la carrera.

EQUILIBRIO

Una paloma bien proporcionada suele estar bien equilibrada.

Un buen equilibrio le permite volar con facilidad y fluidez, con mínima fatiga.

Una paloma bien equilibrada y en buena forma, al ser manipulada, da la impresión de ser más ligera de lo que realmente pesa.

Se sostiene parcialmente sin abrir las alas.

Está llena de energía y es muy ágil.

Su tono muscular ha aumentado.

Sus músculos se han vuelto más flexibles.

Su respiración es más fluida y su capacidad respiratoria ha aumentado.

Durante el vuelo, una paloma así puede realizar el máximo esfuerzo con mínima fatiga.

## EL ALA

Este tema ya ha generado mucha discusión.

Tanto es así que, en la prensa deportiva actual, se pueden encontrar teorías enteras dedicadas exclusivamente al ala.

Incluso uno podría preguntarse si la paloma solo cuenta con sus alas para realizar su trabajo.

Algunos incluso utilizan brújulas e instrumentos de medición.

El colombófilo puede volver a tomar a sus palomas en la mano y examinar si sus alas tienen la longitud y anchura requeridas.

Pero, ¿de qué servirían las largas patas de un atleta si no estuvieran sostenidas por una complexión robusta?

Pero volvamos a la paloma.

Hemos visto que las articulaciones de una paloma bien desarrollada deben ser fuertes y flexibles.

Esto también se aplica al ala.

La paloma debe extender su ala tanto horizontal como verticalmente. La longitud debe ser proporcional a la raza.

La conformación del ala suele ser específica de la estirpe.

Un ala demasiado larga suele ser un signo de degeneración.

Lo mismo ocurre con un ala posterior excesivamente larga.

El ala debe estar bien cubierta, con un borde de ataque grueso.

Se recomienda un ala posterior con decalaje.

Eran las palomas con esta característica las que yo destinaba a la cría.

Un ala tan impermeable como un paraguas, que algunos colombófilos buscaban en el pasado, debe descartarse.

Tras estos análisis, podemos centrarnos ahora en el futuro, en el problema principal del palomar.

## REPRODUCCIÓN

Tanto el macho como la hembra deben poseer la mayor cantidad posible de las cualidades descritas en este libro.

Si la descendencia se parece a los padres, se puede considerar que se ha logrado un buen resultado.

La descendencia superior es la excepción.

La descendencia superior de padres trasladados de un palomar húmedo en el jardín a un palomar seco en la planta superior, o de un criador inexperto a uno experimentado, etc., no debe considerarse una excepción, sino una consecuencia lógica.

Para el emparejamiento, intentemos emparejar, en la medida de lo posible, palomas del mismo tipo, es decir, del mismo tamaño.

Por ello, no emparejemos un macho y una hembra con los mismos defectos, ya que el resultado sería deficiente.

Si tiene una paloma con buena constitución pero rabadilla débil, empareje con una pareja de tamaño similar pero con rabadilla perfecta.

De esta manera, compensará la debilidad de una de ellas.

El macho y la hembra deben complementarse lo mejor posible.

Procedamos de esta manera para minimizar el desperdicio.

## ¿CÓMO DEBEMOS ALIMENTAR A NUESTRAS PALOMAS Y POR QUÉ?

Para ello, es necesario comprender el valor de los alimentos, específicamente su capacidad para generar reservas, reponerlas o mantenerlas.

El oxígeno y el agua son, ante todo, nutrientes esenciales.

Volvamos a las semillas y clasifiquémoslas en dos categorías principales, que analizaremos por separado para comprender por qué y en qué circunstancias deben dárselas a las palomas.

1. Las semillas albuminoides (como las habas, los guisantes y la veza, que son las más comunes) forman el esqueleto y los órganos de las palomas jóvenes.

Por este motivo, reciben aproximadamente un 50 % de semillas albuminoides para favorecer su crecimiento.

Son especialmente adecuadas para la formación de tejidos.

Además, tienen propiedades reconstituyentes.

Por esta razón, a partir del día siguiente o dos días después de una competición, según la intensidad del esfuerzo, las palomas adultas reciben un alimento reconstituyente rico en proteínas.

Este alimento sirve, en parte, como combustible para la contracción muscular y para mantener el equilibrio nitrogenado.

Se elimina casi por completo dos o tres días antes del encestado, sustituyéndolo por cereales ricos en carbohidratos.

2. Carbohidratos (como trigo, maíz, cebada, avena, entre otros).

Producen contracción muscular, tienen un alto valor nutricional y casi toda la cantidad ingerida se digiere y utiliza.

Son fácilmente digeribles, ricos en calorías y se recomiendan como alimento antes del enceste para las carreras.

Si la mezcla se prepara con antelación, retire casi todos los granos ricos en proteínas (habas, guisantes, veza).

Este alimento también ayuda a prevenir la fatiga.

También tenemos semillas oleaginosas, que tienen un alto contenido en grasa.

Generan calor, mantienen las reservas de carbohidratos y permiten su correcta utilización.

Se utilizan con mayor frecuencia en invierno, en climas fríos.

A continuación encontrará las diferentes mezclas de semillas recomendadas para cada estación.

Sin embargo, es aconsejable alimentar con moderación, es decir, en pequeñas cantidades, para evitar que algunas palomas picoteen los granos a su antojo.

Las palomas que no tengan la constitución para soportar la dieta recomendada a continuación serán solo palomas de segunda o tercera categoría, o con una salud deficiente.

No serán más que un éxito efímero.

Busque semillas bien desarrolladas, maduras, sin arrugas y secas.

Pruébelas.

Para el trigo, dé preferencia a las variedades con bajo contenido de harina, como Manitoba, Petit Roux o una variedad similar.

Si alimenta con veza, pregunte a su proveedor por las variedades que debe sembrar; así se asegurará de obtener buenas.

Preparación para el apareamiento

En febrero o marzo, a partir de la separación de los sexos, recomiendo hacer la transición gradual de la composición de invierno a la siguiente dieta:

15% habas; 20% trigo integral; 15% guisantes verdes; 20% maíz; 10% guisantes de invierno; 10% cebada; 5% veza para siembra; 5% sorgo.

Ocho días antes del apareamiento, añadir un poco de avena descascarillada.

Periodo de incubación

Alimentar con moderación, en pequeñas cantidades, para evitar que las palomas tengan sobrepeso.

Las palomas pesadas o gordas no son aptas para las carreras.

35% cebada; 5% guisantes ingleses; 20% maíz; 5% habas; 20% trigo rojo; 5% avena descascarillada; 10% guisantes verdes;

Debido a que es necesario distinguir entre polluelos de menos de doce días y aves más desarrolladas, que ya deben tener una buena estructura ósea y musculatura, la mezcla varía.

Para pichones de hasta doce días

5% habas; 30% maíz; 15% guisantes verdes; 30% trigo rojo; 10% guisantes ingleses; 5% avena descascarillada; 5% veza para siembra.

Para aves jóvenes de más de doce días

15% habas; 20% maíz; 15% guisantes verdes; 25% trigo rojo; 15% guisantes ingleses; 5% avena descascarillada; 5% veza para siembra.

Cuando los pichones tengan seis días, coloque las semillas germinadas en el palomar.

Siembre las semillas de la mezcla de cría y germínelas.

Aquí le explicamos cómo hacerlo.

En recipientes pequeños y poco profundos, coloque tierra de buena calidad.

Siembre las semillas.

Humedezca la tierra o, mejor aún, cúbrala con un trozo de arpillera, que debe mantenerse húmeda hasta la germinación.

Estos recipientes deben estar en una habitación bien iluminada, con una temperatura de alrededor de 17 grados Celsius, en un invernadero o expuestos al sol de primavera.

Para variar, coloque un manojo de pamplina en el palomar, que puede encontrar en lugares soleados durante la primavera.

Esto requiere poco trabajo, pero tendrá efectos beneficiosos en el crecimiento de los pichones.

Durante todo el año, coloque arcilla en el palomar; arcilla auténtica, de la que se usa para hacer ladrillos.

Durante la época de apareamiento, agregue cáscaras de huevo secas, y tan pronto como los pichones tengan doce días, agregue un poco de fosfato de calcio y una pizca de sal de mesa.

Esto ayudará a la formación de los huesos de los pichones.

Durante la muda y en invierno, es recomendable colocar un pequeño recipiente con bicarbonato de sodio en el palomar.

Además, recuerde proporcionarles gravilla o arena sin sal.

Quienes crían a sus polluelos desde temprana edad deberían humedecer ligeramente los granos con aceite de hígado de bacalao a partir de los doce días de edad.

Esto favorecerá el desarrollo óseo.

Los farmacéuticos también pueden proporcionarnos aceites irradiados, que tienen el mismo efecto y son más digeribles.

Esto compensará la falta de luz solar que sufren estas aves jóvenes y precoces.

Temporada de carreras de viudos

La composición del alimento será la misma que para la preparación para el apareamiento, excepto que dos días antes del enceste, para las palomas que participan en carreras de media distancia, y tres días antes para las que participan en carreras de larga distancia, se deberá cambiar a una dieta con mayor contenido calórico y menor contenido de residuos.

La forma más sencilla es eliminar la mayor parte de las habas, los guisantes y la veza.

Al regresar de las carreras y a la mañana siguiente, proporcione la misma composición de semillas.

A partir del día siguiente a la carrera, y comenzando por la tarde, las habas, los guisantes y la veza deberán volver a formar parte de su dieta.

Para las palomas que compiten en carreras de larga distancia, elimine la veza y la avena descascarillada de la mezcla para mantenerlas tranquilas.

Asegúrese también de que descansen lo suficiente después de sus salidas diarias en libertad, para acumular las reservas necesarias para completar largas distancias sin mostrar signos de cansancio.

Reduzca el contenido de proteínas (habas, guisantes, veza) tres días antes del enceste.

Periodo de competición para palomas jugadas al natural

10 % de habas; 25 % de trigo integral; 10 % de guisantes; 25 % de maíz; 20 % de veza para siembra; 10 % de sorgo.

Reduzca también el contenido de proteínas dos o tres días antes del enceste, según la etapa de desarrollo a cubrir, y vuelva a la mezcla indicada anteriormente a partir de la tarde siguiente a su regreso de la carrera.

Periodo de muda

Introduzca gradualmente las semillas de la nueva cosecha en la mezcla, excepto para las palomas que aún estén compitiendo.

15 % de habas; 15 % de maíz; 10 % de guisantes verdes; 25 % de trigo rojo; 5 % de guisantes ingleses; 20 % de cebada; 2% de linaza; 2% de girasol; 3% de colza; 3% de veza.

Mezcla de invierno para palomas de dos años o más

5% de habas; 20% de trigo rojo; 5% de guisantes; 20% de maíz; 45% de cebada; 5% de linaza.

Mezcla de invierno para palomas de maduración tardía

15% de habas; 20% de maíz; 15% de guisantes verdes; 10% de cebada; 15% de guisantes ingleses; 5% de avena descascarillada; 20% de trigo rojo;

Si queremos que las palomas de maduración tardía pasen el invierno, es porque lo merecen.

Por lo tanto, merecen todo nuestro cuidado.

Las palomas de maduración tardía aún necesitan desarrollarse.

Proporcióneles un palomar donde puedan descansar y dales buena comida.

Sin una buena alimentación, no podrán desarrollarse con normalidad, sobre todo porque en invierno no recibirán la misma cantidad de luz solar que las palomas adultas.

Por último, te recomiendo que hagas la transición entre las mezclas de alimento de forma gradual.

No cambies bruscamente de la mezcla de invierno a la de preparación para la reproducción.

Esto lleva varios días.

De esta forma, evitarás trastornos perjudiciales.

Sobre todo, compra semillas sanas y bien desarrolladas para no perjudicar el sistema digestivo de tus palomas.

## ¿CÓMO PODEMOS AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE LAS PALOMAS SIN DROGAS NI DOPAJE?

El dopaje está totalmente desaconsejado.

Daña el organismo.

Es solo una forma artificial de mejorar el rendimiento.

El esfuerzo requerido supera la fuerza y la resistencia física normal de la paloma.

Suprime la fatiga en detrimento del organismo.

El esfuerzo que produce el sistema de viudez ya es un sistema que impulsa a la paloma a rendir al máximo y que requiere múltiples precauciones y cuidados para mantener su estado físico y asegurar su longevidad.

Esto es completamente diferente a dañar el organismo de la paloma con drogas.

Alimentemos de forma lógica y metódica.

Suministremos las semillas puntualmente según el rendimiento requerido y la temporada.

Desde la primera carrera, proporcionemos a los músculos el combustible necesario para recorrer los kilómetros.

Tras el viaje, ofrezcamos semillas para reparar el desgaste.

El descanso y una nutrición adecuada son esenciales para reponer las reservas agotadas.

De lo contrario, los tejidos se resentirán.

Una paloma obligada a recorrer largas distancias sin el descanso necesario ni la alimentación adecuada para recuperarse comenzará a agotar sus reservas.

Su organismo tendrá que prescindir de sustancias esenciales, lo que provocará un desequilibrio entre ingresos y gastos.

Las consecuencias pueden incluir la pérdida del palomar.

Al igual que en los negocios, si los gastos superan los ingresos, la empresa decae y está condenada al fracaso.

Cuando se agota esta última reserva, surgen todo tipo de problemas.

Las palomas pueden colapsar.

Ante este fracaso, todo colombófilo se siente desesperado y perplejo.

Para evitarlo y remediar la situación, repongamos sus reservas.

Primero, démosles descanso.

Dado que la temporada de carreras es corta, todo colombófilo quiere que sus palomas recuperen su forma física lo antes posible.

El esfuerzo muscular que realiza la paloma en cada carrera introduce desechos y ácidos en los tejidos y la sangre.

Para eliminarlos y neutralizarlos, se pueden usar sales alcalinas o una dieta adecuada.

La alcalinización previa también puede reducir y retrasar la fatiga durante las carreras repetidas y aumentar el rendimiento.

Se recomienda la glucosa, como suplemento a la ración normal de grano, durante los periodos de competición.

Esto contrarrestará la bajada de azúcar en sangre causada por el esfuerzo del viaje y proporcionará una reserva de energía muscular.

Tras participar con éxito en varias competiciones, utilizando remedios naturales y antes de notar el menor signo de fatiga, empecé a usar sales alcalinas y glucosa.

Comencé a probar estos productos de forma racional tras conocer sus efectos en el cuerpo humano durante las competiciones deportivas.

¿Acaso no hemos leído que los autores estadounidenses Gordon, Kohn, Sciver, Whiting, etc., observaron los efectos beneficiosos del azúcar en los corredores de maratón?
Los experimentos realizados en los Juegos Olímpicos de Berlín demostraron el aumento del rendimiento y la reducción de la fatiga mediante el uso de glucosa.

Para combatir la fatiga en los ciclistas, el uso de glucosa tiene un efecto beneficioso.

Antiguamente, al cruzar el océano, los aviadores solo comían chocolate.

El autor Dennig observó, tras realizar pruebas en un ergómetro y una cinta de correr, que el rendimiento atlético puede incrementarse entre un 30 y un 100 % mediante la alcalinización previa.

Los autores Dennig y Henderson descubrieron que, tras ingerir sustancias ácidas antes del trabajo, el animal es mucho más propenso a la fatiga.

Si más adelante en la temporada observamos que las palomas están cansadas y sobrecargadas, podemos recuperarlas rápidamente mediante descanso, una dieta equilibrada, glucosa y el suministro de sales alcalinas.

Estas palomas se caracterizan por su musculatura debilitada, extremidades frías y menor vitalidad ocular.

Presentan pérdida de apetito, que suele ir acompañada de diversos problemas digestivos.

El descanso y el uso de glucosa reducirán la fatiga.

No olvidemos proporcionarles a las palomas baños de sol.

La luz solar tiene un efecto tonificante en los tejidos.

Desarrolla y fortalece los músculos, regenera los huesos, aumenta la hemoglobina y proporciona una sensación de bienestar.

Es un excelente estimulante para las defensas naturales del cuerpo.

Los baños de agua fría tienen un efecto tonificante en los músculos y se recomiendan el día anterior a la competición de baloncesto.

Mantienen la elasticidad de las paredes arteriales y, por lo tanto, favorecen la circulación.

Los baños de agua tibia son relajantes.

Se recomiendan al regresar de la carrera o al día siguiente.

## CONSEJOS ÚTILES

Practique la identificación y el control de estas cualidades físicas cruciales.

Practique primero con sus propias palomas y luego con todas las palomas que pueda.

Esta práctica, aplicada durante años en estudios de arquitectura de gran envergadura, ha confirmado sistemáticamente la validez de mis consejos.

No se deje engañar manipulando una paloma supuestamente buena sin revisar la anilla y los resultados obtenidos, ya que el dueño puede hacerla pasar por su paloma gris de buena calidad cuando solo se parece al plumaje.

Esto me sucedió.

En una exposición, un dueño me dio su paloma gris de buena calidad.

No pude evitar decirle que esta paloma tenía deficiencias en cuanto a musculatura.

Su respuesta fue que eso no le importaba.

¿Sabía lo importante que es? ¿Le abrí los ojos?

No fue hasta dos o tres años después que se confirmó la verdad, cuando tuve la oportunidad de manipular la verdadera paloma gris de buena calidad, que aún conservaba una buena musculatura.

La paloma en exhibición solo tenía el plumaje y el sexo de la paloma de buena calidad.

## LO QUE TODO BUEN COLOMBÓFILO DEBE SABER

Para las palomas que no fueron entrenadas el año anterior, los vuelos se introducen de forma gradual y metódica durante la incubación, sin llegar al agotamiento.

Tras unas semanas de vuelos libres, serán inmunes a la fatiga.

Las palomas entrenadas en años anteriores y que no se han visto sobrecargadas por los viajes se ponen en forma más rápidamente.

Es fundamental evitar el entrenamiento excesivo, y especialmente los vuelos forzados con la bandera.

El exceso de trabajo es perjudicial tanto para los músculos como para el sistema nervioso.

Examine las palomas en primavera, antes del entrenamiento.

A medida que avanza el entrenamiento, observará un aumento de la masa muscular.

Preste atención a su respiración; se volverá tranquila y regular.

La circulación se estabilizará, la grasa disminuirá y este periodo inicial de adaptación permitirá a sus palomas completar las primeras etapas del entrenamiento y las primeras carreras con el máximo rendimiento y la mínima fatiga.

Tras algunas carreras, el exceso de grasa habrá desaparecido.

El rendimiento de la paloma en las carreras siempre estará relacionado con su constitución.

Observa, en función del desarrollo muscular, su máximo rendimiento y su declive.

Después de las carreras, durante la muda y en invierno, les daba tostadas cada semana, frotadas con un poco de ajo.

Además, de vez en cuando, les daba una zanahoria cruda, cortada en trozos pequeños, ligeramente salada.

No manipule las palomas jóvenes para examinarles las patas traseras; son muy frágiles y hasta una ligera presión puede tener consecuencias nefastas.

Si introduce una paloma nueva en su palomar, examínela minuciosamente para asegurarse de que no contamine a toda la colonia.

Si una paloma ajena entra en su palomar, retírela inmediatamente.

Seleccione sus palomas según las cualidades requeridas y descritas en este folleto.

Maneje y cuide a sus palomas de forma lógica y tendrá pocos o ningún contratiempo, además de obtener buenos resultados.

Si duda en introducir una paloma, espere hasta haber adquirido experiencia, o introdúzcala para experimentar y así aprenderá algo.

Solo manipule a sus palomas cuando sea absolutamente necesario, durante el periodo de muda.

Nunca las persiga.

No las obligue a realizar acrobacias innecesarias en el palomar, ya que las contracciones musculares repentinas y violentas suelen causar desgarros musculares y lesiones articulares.

Pueden provocar una incapacidad prolongada para volar, que requiera descanso, e incluso causar una distensión muscular.

Una paloma que ingrese con un desgarro muscular o una lesión articular, aunque parezca leve, no regresará o regresará con una pata rota.

Cuida bien de tus palomas para que sean fáciles de atrapar y regresen en cuanto oigan tu voz.

## EL JUEGO DE LOS JÓVENES

Cualquier colombófilo que conozca su estirpe y pueda identificar las cualidades descritas anteriormente en las palomas jóvenes podrá evitar enviarlas a recorrer 400 km o más con fines de selección.

Obligarlas a viajar tales distancias representa un obstáculo enorme para el desarrollo de la paloma joven.

Un ejemplo, entre muchos que hemos visto en el pasado, debería convencerles de la veracidad de lo que digo.

Los muchachos que trabajaban en las fábricas de ladrillos, jóvenes robustos de entre 12 y 14 años, que empujaban carretillas cargadas de arcilla, mostraban las marcas del daño que este trabajo excesivo causaba a su desarrollo.

Este trabajo no era apropiado para su edad, y la compresión de sus huesos y músculos era fácilmente perceptible (por no mencionar otras extremidades y órganos que sufrían graves daños).

Tenían las piernas arqueadas, músculos grandes, demasiado duros y cortos, mientras que un desarrollo normal, mediante un entrenamiento adecuado a su edad, les habría proporcionado huesos largos y sin deformaciones, y músculos largos con flexibilidad normal.

Una paloma destinada a las carreras de larga distancia debe desarrollarse con normalidad hasta los tres años sin ser sobrecargada de trabajo.

Todo aficionado debe aprender a seleccionar estas palomas jóvenes por sí mismo.

Comience por comprobar la conformación de la horquilla, su musculatura flexible y suficiente, y su buena constitución.

Sus extremidades y órganos deben desarrollarse a medida que crecen, mediante vuelos y entrenamiento equilibrados, una nutrición adecuada y un entorno sano y bien ventilado.

Deben tener su propio palomar, donde cada una encuentre su lugar.

Si hay palomas viejas entre ellas, serán expulsadas y las pérdidas serán enormes.

Para asegurar que las palomas jóvenes se desarrollen de forma armoniosa y normal, y alcancen un equilibrio perfecto, este es el procedimiento que yo seguiría:

Palomas jóvenes:

comenzar con numerosas sesiones de entrenamiento libre consecutivas.

Participar en una o dos carreras de corta distancia y, para cerrar la temporada, una carrera que no supere los 250 km.

Esto, por supuesto, con buen tiempo y cuando las palomas jóvenes tengan un buen plumaje. Examinar su estado a su regreso de las carreras.

Palomas de un año:

siempre numerosas salidas libres.

Participar en carreras de corta distancia, en su categoría, y cerrar la temporada con una inscripción en una carrera de aproximadamente 300 km.

Palomas de dos años:

participar en carreras de corta y media distancia y, para cerrar la temporada, una inscripción en una carrera de 400 km.

Aproximadamente.

Tres años.

Ha llegado la edad de máxima potencia y resistencia.

Se puede continuar con toda la fuerza, tomando, por supuesto, la precaución adecuada de permitir periodos de descanso suficientes entre las sesiones de entrenamiento para que la paloma pueda recuperarse.

UN EJEMPLO SIGNIFICATIVO

Un amigo compró algunas palomas en mi subasta.

Como era principiante, me pidió que emparejara sus palomas después del invierno.

Para continuar con mis experimentos y demostrar que todo lo descrito en este folleto es, en efecto, el método correcto, emparejé dos parejas: dos hembras jóvenes de cría tardía, un macho de un año y un macho de cinco años.

De estos emparejamientos nacieron cuatro machos excepcionales (fotos al final del libro):

N.º 2.392.056-53 El Emperador;

N.º 2.392.057-53 El Invencible;

N.º 2.392.058-53 Eisenhower;

N.º 2.392.059-53 Churchill.

Estos cuatro machos obtuvieron los máximos galardones como pichones y palomas jóvenes, cerrando la temporada de 1954 el 17 de julio con el quinto, octavo y decimoquinto premio en Dourdan (330 kms).

En 1955, el número 2.392.058 se incorporó a la cría.

Uno de sus descendientes, el número 2.071.324-54, obtuvo el sexto premio entre más de 2.000 palomas, con cuatro minutos de ventaja.

A partir de 1955, aconsejé que los otros tres machos compitieran con el sistema de viudez.

Colaboré activamente con mi amigo, y el método seguido se describe detalladamente tras enumerar los resultados obtenidos con los tres machos.

Participaron en el mismo club durante casi toda la temporada.

ASOCIACIÓN DE COLOMBÓFILOS DE ANDERLECHT 1955

| Fecha: | Premio: | Velocidad m/m: | Palomas: |
|---|---|---|---|
| 8 mayo | 8º | 1542 | 1009 |
| 15 mayo | 13º | 1492 | 1427 |
| | 20º | 1482 | Primera serie de honor. |
| 25 mayo | 23º | 1421 | 1512 |
| 12 junio | 6º | 1595 | 1515 |
| | 1º | 1571 | |
| 26 junio | 3º | 1100 | 2774 |
| | 26º | 1081 | |
| | 30º | 1078 | más la primera serie de las tres mejores marcas. |
| 3 julio | 22º | 1251 | 2036 |
| 10 julio | 13º | 1095 | 2210 |
| | 16º | 1090 | más la primera serie de las dos mejores marcas. |

17 julio. 3º 1170 m

47º 1132 m más la primera serie de la primera y la segunda marcada.

ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL DE BRUSELAS-OESTE

30 julio anilla 2392.056 9º 1.008 m/m

0.57 13º 1.002 m/m

0.59 15º 999 m/m

Además de la primera serie de tres primeros clasificados.

Con viento del norte y 5 horas y 15 minutos de vuelo.

Algunas inscripciones se realizaron con fines puramente experimentales.

Es difícil convencer a un joven aficionado de que una paloma que ganó el primer premio el domingo anterior no puede participar el domingo siguiente si se ha observado una disminución en su tono muscular.

Esto ocurrió con dos de los tres machos mencionados anteriormente.

A su regreso, cuando la paloma volvió a casa después de que la carrera hubiera terminado, el aficionado se convenció.

El domingo siguiente, con los músculos nuevamente firmes, volvió a obtener el primer lugar.

Si tiene alguna duda sobre la condición de la paloma, lo mejor es no inscribirla en la carrera.

Se beneficiará de un domingo de descanso, lo que solo puede aumentar sus reservas y ser favorable para el próximo resultado.

A continuación se describen los cuidados, el manejo y los consejos útiles para lograr los resultados mencionados.

Tan pronto como los pichones son destetados, y después de una selección inicial, los machos jóvenes prometedores se colocan en un palomar equipado con cajas de viudez.

Las cajas permanecen cerradas; descansan sobre el frente.

No tendrán otro lugar para descansar en el palomar.

Disfrutarán de numerosas salidas con vuelos libres, que irán aumentando gradualmente.

La salida principal es al amanecer, cuando vuelan juntos.

Volarán lejos, y el ejercicio libre tras el descanso nocturno no los agotará.

Tras cada regreso, se creará una penumbra.

El descanso después de cada vuelo minimiza su esfuerzo físico.

El ejercicio mejora la función respiratoria y circulatoria, desarrolla cualidades activas, fuerza de voluntad, valentía, resistencia, fuerza, agilidad y determinación.

También aumenta la masa muscular.

Su entrenamiento comienza tras la muda de la segunda pluma primaria y termina con la muda de la quinta.

El entrenamiento se realizará únicamente con aves jóvenes en buen estado, con buen tiempo y, preferiblemente, con liberación el mismo día.

Los machos se reservan para las carreras de viudez del año siguiente.

Evite los viajes excesivos, ya que podrían perjudicar su desarrollo.

Se pueden seleccionar hembras tras completar una etapa de 300 km.

Recomiendo hacerlo experimentalmente.

Antes de enjaularlas, determine sus fortalezas y debilidades físicas.

Las que no puedan competir permanecerán en ruta o mostrarán signos de fatiga y se recuperarán lentamente.

Las demás no mostrarán signos de fatiga y se recuperarán rápidamente.

Durante el periodo de muda posterior a las carreras, cambie gradualmente a un pienso específico para la muda.

Asegure una buena ventilación en el palomar durante el día y redúzcala ligeramente por la noche, a medida que baja la temperatura.

Deje que sus palomas disfruten de los últimos rayos de sol.

Las palomas jóvenes menores de un año recibirán el alimento recomendado para palomas jóvenes a partir de los doce días de edad durante el invierno.

A los dos años, se les dará una dieta de invierno.

Empareje a sus palomas lo más tarde posible.

Durante febrero, cuando la temperatura sea demasiado suave, separe a las hembras durante al menos un mes.

Este periodo de transición se utiliza para cambiar gradualmente su pienso de invierno a un pienso de preparación para el apareamiento.

Durante este periodo de separación, los machos y las hembras saldrán por separado y de forma alternada.

Las salidas se programan de manera que los machos ocupen la parte delantera de su caja nido por la noche.

El apareamiento puede tener lugar a finales de marzo, si el clima es favorable y después de que se haya observado que el tono muscular ha aumentado y las aves están bien desarrolladas.

Como preparación para el apareamiento, las cajas se abren por primera vez a los pichones de un año.

Las hembras se introducen unos días después.

Proporcióneles sílex, gravilla sin sal, arcilla mezclada con cáscaras de huevo secas y ramitas.

La puesta de huevos tendrá lugar en un plazo de ocho días con palomas sanas y bien preparadas.

El periodo de incubación requiere especial atención.

La inmovilidad impuesta por el periodo de incubación reduce el valor fisiológico del tejido muscular.

Para remediarlo, son necesarias salidas frecuentes.

Estas sesiones iniciales de entrenamiento en libertad eliminarán el exceso de grasa.

Estabilizarán rápidamente la respiración y la circulación, lo que aumentará la masa muscular.

El alimento de incubación debe distribuirse con moderación y en pequeñas cantidades, para evitar que algunas palomas engorden y otras adelgacen demasiado.

Muchas palomas tienen preferencia por ciertos granos.

Las que picotean demasiado dari se mantendrán delgadas, mientras que las que comen maíz engordarán.

El exceso de grasa es un obstáculo importante para el correcto funcionamiento de la respiración y los órganos digestivos.

Preste mucha atención al comprar las semillas.

Busque veza bien desarrollada, madura, sin arrugas, seca y sana.

Pruébelas.

Para el trigo, elija variedades con bajo contenido de harina, como Manitoba Red o similares.

Para las vezas, pida las destinadas a la siembra.

Es posible que ya no estén en su mejor momento o que se les haya extraído parte del aceite.

Si intenta germinarlas, los brotes serán débiles.

Retire los pichones que tengan dificultades para eclosionar; carecen de vitalidad.

A los ocho días de edad, reemplace los pichones de los padres que no desee criar.

A los padres con pichones menores de doce días, aliméntelas con la fórmula de crecimiento para la primera etapa.

A los que tengan pichones mayores de doce días, aliméntelas con la fórmula para polluelos de segunda etapa.

Al destete, lo mejor es colocar a los machos jóvenes directamente en su futuro palomar, equipado con casas para viudas.

Las casas permanecerán cerradas hasta el momento del emparejamiento.

Si no puede reservarles un palomar, al final de la temporada, ofrézcales las casas que queden libres en el palomar de los machos viudos mayores.

Algunos se habrán quedado en el camino, otros deberán retirarse y sus casas podrán usarse para los machos jóvenes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta una precaución.

Los machos jóvenes deben alimentarse, durante el invierno, con la comida de las crías, y solo a los dos años de edad se les dará la dieta de invierno, al igual que a las aves mayores que ocupan el mismo palomar.

Después de colocar a las crías de la primera nidada en los nidos, se tolerará una segunda nidada de diez días.

Las hembras se separarán de los huevos después de diez días.

La noche siguiente, se retirará el primer huevo; la noche siguiente, se retirará el segundo.

Los machos abandonarán la cazuela y se quedarán solos sobre ella, que estará volcada. Los nidos permanecerán abiertos durante la temporada de carreras.

El bebedero común, siempre lleno de agua fresca, permanecerá en el dormitorio toda la semana, hasta el día del enceste, y luego se sustituirá por pequeños bebederos sujetos a los nidos; los machos los encontrarán allí al regresar de cada vuelo.

Un vuelo libre temprano por la mañana y otro por la tarde los inmunizarán contra la fatiga y los pondrán en forma.

Después de cada vuelo, una vez que hayan regresado y se hayan tranquilizado, se les distribuirá la comida en una bandeja con pequeños separadores para evitar que se picoteen.

Se les puede dar alimento adicional en sus nidos.

Poco después, se oscurecerá el palomar.

La ventilación siempre será cuidadosa.

Las hembras se colocarán en un aviario, en jaulas individuales.

Estas jaulas también pueden ubicarse en cualquier otro lugar seco y bien ventilado.

Debe evitarse a toda costa el apareamiento entre hembras.

Durante algunas semanas, recibirán alimento suplementario.

Se les proporciona una mezcla de semillas para calentar el ambiente dos días antes de que los machos sean introducidos en las cestas.

La mezcla que se les da a las hembras estará compuesta por:

50% de cebada; 15% de maíz;  25% de trigo;  10% sorgo; 1 guisante; 1 haba; 1 veza.

Se les presenta a los machos antes de su partida, bien limpias (con las patas lavadas).

Mientras los machos están en la cesta, las hembras reciben un baño.

Se les permite deambular libremente durante media hora, con la entrada cerrada.

A su regreso, se les alimenta hasta saciarse y se las devuelve inmediatamente a sus jaulas.

Se cuelgan recipientes con agua fresca en las jaulas.

Cuando el macho regresa, se les alimenta temprano y se las devuelve a sus jaulas.

Solo el bebedero estará en la parte delantera.

No se puede dejar ni una sola semilla suelta en las bandejas, porque es esencial que la hembra se concentre exclusivamente en su pareja y no empiece a picotear ni a mostrar indiferencia.

El macho desea, tanto antes de partir como a su regreso, ver la completa devoción de su pareja.

En este caso, y con la condición física adecuada, su desempeño será excepcional.

Si nota indiferencia por parte de la hembra después de tomar todas estas precauciones, preséntele una hembra más cariñosa.

El sistema de viudez que he elegido, tras probar muchos otros, consiste en mostrarle a la hembra al macho en su bandeja antes de partir.

El tiempo que tarda la hembra en acercarse al macho acurrucado en la bandeja y acariciarlo es suficiente.

Estos machos comienzan con la moral alta y renovada confianza, lo que los hace menos nerviosos.

Así fue como se criaron los cuatro machos de 1953 cuando eran jóvenes, ganando numerosos premios importantes y cerrando la temporada con una participación en Dourdan, donde terminaron quinto, octavo y decimoquinto.

A los dos años, fueron sometidos por primera vez al régimen invernal.

Para los periodos de separación y preparación para el apareamiento, consulte lo que escribimos el año anterior.

Uno de los tres machos que compitieron en 1955 no se reprodujo en primavera, y no sufrió contratiempos.

Se recuperó más rápido y mantuvo su mejor forma física durante mucho tiempo.

Aún podría haber competido hasta el 15 de agosto.

Había incubado los huevos del primer nido durante dos días.

Unos bonitos huevos de yeso habían sustituido a los reales.

En el segundo nido, tras diez días de incubación, los dos huevos se retiraron sucesivamente con un intervalo de un día, y se convirtió en viudo al mismo tiempo que los otros machos.

Los viudos que no se reproducen al principio de la temporada suelen mudar tarde.

Por lo tanto, le recomiendo que pruebe el siguiente sistema:

<u>Palomas jóvenes:</u>

En primavera, críe un ave joven.

En el segundo nido, aplicar el sistema de viudez tras un periodo de incubación de diez días.

En agosto-septiembre, criar un polluelo.

<u>Palomas de dos años:</u>

En primavera, sobre-incubar huevos de yeso hasta que sean abandonados.

Aplicar directamente el sistema de viudez o, si es demasiado pronto en la temporada, aplicarlo en el segundo nido, tras un periodo de incubación de diez días.

<u>Palomas de tres años:</u>

Proceder como con las aves de un año.

Palomas de cuatro años:

El mismo sistema que para las aves de dos años y alternar sucesivamente en los años siguientes.

Los otros dos machos experimentaron, uno, un fallo durante la muda de la primera pluma primaria, y los otros dos, fallos durante la muda de la primera y segunda pluma primaria.

Fue la disminución del tono muscular la que causó las alteraciones observadas, que fueron solo temporales.

Los músculos de los hombros, ya no tan robustos, y la quilla, que se había vuelto prominente, indicaban una disminución en el volumen de los músculos de los hombros y los pectorales.

Después de unos días, cuando brotaron las nuevas plumas de vuelo, la musculatura volvió a la normalidad y las palomas que participaron en estas condiciones volvieron a ganar los primeros premios.

Alrededor del 15 de julio, cuando los viudos ya habían completado varios viajes, y antes de observar el menor signo de fatiga, comencé a alcalinizarlos para prolongar su condición.

Ante la aparición de síntomas de debilidad, un período por el que pasa todo colombófilo durante el sistema de viudez, y para evitar el colapso posterior, el uso de sales alcalinas y glucosa como suplemento siempre me ha dado buenos resultados.

Esto no es dopaje.

El esfuerzo muscular produce desechos en los tejidos y la sangre, y genera ácidos dañinos que causan fatiga.

Combatí estos ácidos neutralizándolos con sales alcalinas.

Para prevenir la fatiga y prolongar su rendimiento, les di, tres días antes del enceste, una mezcla de sales alcalinas para aumentar sus reservas alcalinas.

Son fáciles de administrar.

Al regresar del viaje, por la tarde, recibieron una dosis menor para evitar una interrupción brusca.

A partir de ese momento, también les di glucosa.

El azúcar, especialmente la glucosa, aumenta el rendimiento y también reduce la fatiga.

Después de cualquier esfuerzo, el nivel de azúcar disminuye significativamente.

Al regresar de una carrera, les di una galleta ligeramente humedecida con leche cruda, a la que añadí una cucharadita de glucosa y una pizca de sal.

Las palomas no recibieron nada más hasta que terminaron de comer esto.

Durante los dos primeros días de la semana, recibieron glucosa, y de miércoles a viernes, sales alcalinas.

Así llegamos al final del período de viudez.

Es hora de pensar en re-introducir a las hembras.

Ahora les toca el turno a las hembras.

Reemplazarán a los machos en las carreras y no deben subestimarse.

Las parejas se juntan para que los viudos puedan criar a un pichón y las hembras puedan competir en las carreras de final de temporada.

Los viudos disfrutarán de un merecido descanso.

Cuando las parejas estén bien establecidas, las hembras pueden competir durante siete domingos consecutivos.

Si participan en carreras de media distancia, compitan en equipos: la mitad para la carrera y la otra mitad para el descanso.

Así es como se procede: Diez días antes del final de las carreras de los viudos, se cambia la alimentación de las hembras a la dieta recomendada para las carreras naturales.

Estas hembras habrán sido entrenadas desde pequeñas.

Pueden competir una vez en el sistema de viudez, mientras esperan la puesta de huevos, y luego en el nido.

Para competir con el sistema de viudez, deben ir a entrenar el martes siguiente al último domingo de carreras con los machos.

A su regreso, encuentran a su macho en el nido.

El miércoles tienen una segunda sesión de entrenamiento.

El sábado participarán en una carrera de velocidad.

Una vez lo intenté y gané tantos premios en Saint-Quentin (100 kms) como palomas tenía inscritas.

Después, competirán en el nido.

El lunes por la tarde, al día siguiente de terminar las carreras con los viudos, las hembras se colocan en su nido, donde pasan la noche con su macho.

El martes por la mañana, tras recibir cuidados, la hembra se confina en una mitad del compartimento y el macho en la otra.

Pueden verse sin acercarse.

Alrededor de la tarde (18:00), se liberan, una pareja a la vez.

Los miércoles hacemos lo mismo, liberándolos alrededor de las 17:00.

Los días siguientes, procederemos de la misma manera, adelantando las liberaciones una hora cada día.

Es probable que la primera puesta se produzca el lunes o martes siguiente.

Este sistema evitará la caza innecesaria y agotadora, y las palomas conservarán suficientes reservas para criar a un pichón y realizar una buena muda.

Es preferible que las hembras compitan al final de la temporada en lugar de en primavera.

Si una hembra se pierde al final de la temporada, solo se lamenta la pérdida del ave, mientras que en primavera, la pérdida de una hembra puede influir negativamente en el rendimiento del macho en las carreras.

Su apego a su nueva hembra probablemente no será tan fuerte.

Las hembras, bien cuidadas y descansadas durante las carreras de viudez de los machos, podrán participar con éxito en las carreras de final de temporada.

Pueden competir siete veces consecutivas.

Supongamos que las carreras con el macho terminan el 1 de agosto.

Primera carrera de viudez el 7 de agosto.

La puesta tendrá lugar el lunes 8 o el martes 9 de agosto.

Segundo compromiso, con huevos de cinco días, el 14 de agosto.

Tercer compromiso, con huevos de doce días, el 21 de agosto.

Cuarto compromiso: Retrasar la eclosión de los huevos y presentar un polluelo media hora antes de colocarlo en los nidos.

Jugando con dos parejas, las hembras en reposo pueden incubar cuatro huevos hasta el regreso de las hembras comprometidas.

Mientras esperan el regreso de las hembras, los machos reciben huevos de yeso.

Quinto compromiso, con un pichón de siete días.

Sexto compromiso, con un pichones de catorce días.

En este caso, se recomienda retirar al macho cuando el polluelo tenga doce días y presentarlo al regresar de los viajes.

Séptimo compromiso: La hembra estará sola con el polluelo.

La hembra solo saldrá a volar dos veces al día.

Durante estos vuelos, el macho tendrá la oportunidad de alimentar a la cría; será retirado del palomar inmediatamente después de alimentarla.

Al regresar del séptimo y último vuelo, la hembra encontrará a su pareja y a la cría en el nido.

Una hora después, se cerrará el nido y las crías se colocarán en el suelo con una buena capa de paja.

Los huevos que se encuentren en el suelo se reemplazarán por huevos de yeso a partir del décimo día.

Las hembras se verán molestadas al mover los huevos diariamente, de a pocos, hacia el centro del palomar, y por las crías en el suelo.

Las noches frías de octubre detendrán la puesta.

Mediante este método, deberíamos poder alcanzar el periodo de separación, que recomiendo en febrero o marzo.

Durante este periodo de separación, nos prepararemos para el apareamiento.

Las crías criadas al final de la temporada permanecerán en el palomar con sus padres hasta que las aves adultas pasen a su alimentación de invierno.

Como se ha descrito anteriormente, la transición de una estación a la siguiente es gradual y apropiada, proporcionando los cuidados y la alimentación necesarios.

## EL JUEGO AL NATURAL A GRANDES RASGOS

No he profundizado tanto en este método de cría porque los aficionados conocen multitud de trucos.

Este método permite una mayor variación a la hora de aprovechar el instinto y el carácter de la paloma.

Requiere más tiempo y experiencia que la viudez, que he tratado extensamente en este libro y que es más sencilla y está más de moda.

Pero no puedo dejar de mencionar algunos métodos de cría natural.

Aquí están:

Machos con incubación prolongada, presentando un pichón durante media hora.

Lo mismo para las hembras.

Entre el primer y el segundo huevo, tras haber evitado previamente persecuciones agotadoras.

Con pichón a partir de los seis días.

Con pichón mayor y el primer huevo.

Dos machos emparejados con una sola hembra.

El juego de "kotjes", donde entra en juego un luchador.

También existe la semiviudez, donde el macho o la hembra permanece solo con su pichón.

En este caso, se puede hacer competir al macho y a la hembra al mismo tiempo.

El macho se separa de la cría el viernes, mientras está solo con ella; la hembra, el sábado, antes de enjaularla.

Así fue como gané el primer y el tercer premio, entre 1800 palomas, con la primera serie de palomas que quedaron en primer y segundo lugar, lo que me permitió llevarme a casa un precioso reloj de pie Westminster.

Como describí anteriormente, las hembras pueden jugar con el nido seis veces consecutivas y una vez en el sistema de viudez.

Hay muchas maneras de explotar los celos.

Depende del criador explorar todas las posibilidades de su palomar.

Acercar los nidos, etc.

Un método que me funcionó dos años seguidos es el siguiente:

Cada día sacaba una hembra de sus huevos e inmediatamente la volvía a colocar en su nido, para provocarla.

El día de la puesta, mientras la sacaba con una mano, con la otra tomaba a su vecina, que ocupaba el nido contiguo, y la colocaba sobre sus huevos sin que se diera cuenta.

Contrario a mi práctica habitual, la colocaba sobre la tabla de entrada.

En cuanto veía su nido ocupado por otra hembra, se desataba una pelea y la sacaban mientras la otra regresaba a los huevos.

Ganó el primer premio, superando a los mejores machos de la región, en la competencia del sistema de viudez.

A los siete años, ganó el noveno premio de la misma manera en Lovaina, en el Concurso Provincial.

## CONCLUSIONES

Así llegamos al final de este folleto, con la esperanza de que el aficionado haya aprendido algo que le beneficie a él y a sus palomas.

Las carreras de palomas no deben considerarse una profesión, sino un arte.

Un arte que solo se aprende con mucha paciencia y una aguda capacidad de observación.

Nada puede escaparse al aficionado en su propio palomar.

Debe ser capaz de definir con certeza las cualidades atléticas y físicas, así como los defectos de cada paloma.

Seleccione su propia colonia basándose en este método y se sorprenderá de los resultados.

Practique, mediante la práctica, palpando a sus palomas, para desarrollar sus habilidades y adquirir la destreza necesaria para definir el volumen de la musculatura, sus cualidades y los cambios que experimenta; asimismo, para la conformación y rigidez del cuerpo, el equilibrio, etc.

Porque no olvidemos que una buena paloma mensajera debe poseer un conjunto completo de cualidades.

Debe combinar todas las cualidades atléticas y físicas que definen a una buena paloma.

He intentado ser lo más sencillo, claro y conciso posible, para que cualquier aficionado pueda comprenderlo.

Ponga a prueba estas pautas generales de inmediato, y siga cuidadosamente las instrucciones del método para establecer una estirpe estable o mejorar una existente.

Este trabajo le ayudará a lograr este resultado con la mayor probabilidad de éxito.

FIN

L'EMPEREUR
n° 2932.056-53

L'INVINCIBLE
n° 2932.057-53

EISENHOWER
n° 2932.058-53

CHURCHILL
nº 2932.059-53



Le bon yearling (n° 2071.324-54)
descendant du 2392.058-53 qui est réservé
à la reproduction.